

Cernicalo común

Pequeña rapaz, fácil de ver en los alrededores del azud, bien en alguno de sus posaderos o cerniéndose en el aire en busca de su alimento diario. En verano podemos ver además al cernicalo primilla, muy parecido al común.



Esta es una pequeña muestra de alguna de las aves que podemos ver en el azud de Riobobos y alrededores. Para la observación e identificación de las distintas especies necesitaremos, al menos, unos prismáticos de 8 a 10 aumentos y, si disponemos de él, un telescopio ya que la distancia a la que se encuentran es considerable. La S.E.O. ha editado una guía de aves muy recomendable para su utilización en el campo y con un precio muy interesante.

No olvidemos el cuaderno y el lápiz para anotar nuestras observaciones y seguir practicando lo del dibujo.

la facendera

4 de febrero de 2001

Azud de Riobobos


Cigüeña común

Conocida por todos, suele frecuentar los humedales y zonas encharcadas.




Garza real

Es la garza más común y fácil de ver. Frecuente en zonas encharcadas. También podemos ver otras garzas, como la garceta que tiene las patas negras y pies amarillos con plumaje blanco.



Cormorán grande

Se trata de un ave marina que prefiere pasar los inviernos con nosotros en las aguas interiores de pantanos y ríos.



Zampullín chico

Gran buccador de pequeño tamaño y coloración general pardo rojiza. En Riobos también podemos encontrar al zampullín cuellinegro, aunque en menor cantidad.




Somormujo labanco

Es muy común aunque no constituye grandes aglomeraciones. Hay que destacar el particular diseño de la cabeza. Se sumerge continuamente.

Anadé real

Es el pato más común y el más abundante. Se diferencia por su cabeza verde metalizada y por tener el espejuelo de color azul. La hembra es de color pardusco, pero mantiene el color del espejuelo.



Porrón común

Se distingue por su cabeza de color castaño y pico azulado con la punta negra. Pecho y popa de color negro, resto del plumaje de tonos claros. Típico pato buccador.



Pato cuchara

Se distingue por su característico pico y por tener la cabeza verde-azulada y el pecho blanco con una mancha rojiza en los flancos.

Ansar común

Es el más común de los gansos, llegando a formar grandes bandadas. Durante el día suele permanecer pastando en los campos de cultivo.



Avefría

Suele

visitarnos en invierno, siendo más abundante cuanto más frío hace. Muy característico su plumaje iridiscente y su cresta de plumas.



Porrón moñudo

Pato de color negro con los flancos blancos. Destacan unas plumas que le salen de la cabeza a modo de coleta. Es un invernante poco habitual.

